

# Hippuridales

## Truskavcotvaré

SPRACOVALA M. PENIAŠTEKOVÁ

### HIPPURIDACEAE DC.

#### TRUSKAVCOVITÉ

##### *Hippuris* L.

##### Truskavec

##### *Hippuris vulgaris* L.

##### Truskavec obyčajný

Ic.: Tab. 26, fig. 5, p. 495

*Hippuris vulgaris* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 4, 1753.

Trvácá, vodná alebo močiarna bylina, s plazivým, rozkonáreným podzemkom, stonka dutá, jednoduchá, vzpriamená alebo oblúkovito vystúpavá 10—40 (—50) cm dlhá, občas plávajúca,  $\pm$  1,5 mm hrubá, listy v 6—14 (—20)-početných praslenoch, čiarkovité, celistvookrajové, hrotité (submerzné, chabé, nad hladinou vyčnievajúce, tuhé), 0,8—2 (—8) cm dlhé, dohora oblúkovite alebo rovnovážne odstávajúce. Drobné kvety v praslenovom strapci alebo jednotlivo sediace v pazuchách listov bez listeňov, obojpohlavné alebo jedнопohlavné, bez kvetného obalu (kalich tvorený nezreteľným kožovitým lemom na hornom okraji kvetnej čiašky), tyčinka 1, semenník spodný, jedнопlodolistový, s 1 anatropným vajíčkóm. Kôstkovička vajcovitá, hladká, 1,5 mm dlhá.

Chromozómy:  $2n = 32$ , okr. 6, Gabčíkovo (Murín in: Májovský et al. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen.-Bot. 25: 8, 1976).

Variabilita: Premennivý v tvare, pružnosti, veľkosti a počte listov v pra-